

適正使用のお願い

2011年8月
MSD株式会社

5 α -還元酵素II型阻害薬

◎男性型脱毛症用薬◎

劇薬
処方せん医薬品

プロペシア[®]錠 0.2mg

プロペシア[®]錠 1mg

(フィナステリド錠)

— 錠剤を分割・粉砕しないこと！ —

(分割・粉砕した本剤に妊婦が接触した事例がありました)

「使用上の注意」の項で、本剤を分割・粉砕しないよう注意喚起しておりますが、分割・粉砕して服用している事例が集積されており、その中には妊娠している方を含む女性が分割・粉砕した粉に接触した事例も報告されております。妊婦が本剤の有効成分を吸収すると、本剤の薬理作用（DHT低下作用）により、男子胎児の生殖器官等の正常発育に影響を及ぼすおそれがあります。

本剤を分割・粉砕しないよう、調剤される方や患者様へ再度ご注意くださいようお願い申し上げます。

また、本剤のご使用に際しましては、弊社が提供しております「プロペシア[®]錠服薬ガイド」をご活用いただき、本剤を分割・粉砕しないよう、患者様にご指導をお願い申し上げます。

《調剤及び服用時の注意》

- ・本剤を分割・粉砕しないで下さい。
- ・本剤が粉砕・破損した場合、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人及び授乳中の婦人に、本剤を取扱わせないで下さい。

本剤はコーティングされているので、割れたり砕けたりしない限り、通常の手扱いにおいて有効成分に接触することはありません。

《分割・粉碎に関する使用上の注意（抜粋）》

プロペシア[®]錠0.2mg、プロペシア[®]錠1mg

禁忌（次の患者には投与しないこと）

- (2) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人及び授乳中の婦人〔「重要な基本的注意」、「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照〕

重要な基本的注意

本剤の使用に際しては、患者に次の事項を説明すること。

- (1) 本剤を妊婦に投与すると、本剤の薬理作用（DHT低下作用）により、男子胎児の生殖器官等の正常発育に影響を及ぼすおそれがある。〔「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照〕
- (2) 本剤を分割・粉碎しないこと。
本剤が粉碎・破損した場合、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人及び授乳中の婦人は取扱わないこと。本剤はコーティングされているので、割れたり砕けたりしない限り、通常の手扱いにおいて有効成分に接触することはない。〔「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照〕

妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- (1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。〔「重要な基本的注意」の項参照〕
- (2) 授乳中の婦人には投与しないこと。〔本剤がヒト乳汁中へ移行するかは不明である。〕

適用上の注意

- (1) 調剤及び服用時：本剤を分割・粉碎しないこと。
本剤が粉碎・破損した場合、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人及び授乳中の婦人は取扱わないこと。

リンク集

プロペシア錠 製品情報サイト

・添付文書

・医薬品インタビューフォーム

・製剤写真

<http://www.msd.co.jp/hcp/product/alopecia/Pages/home.aspx>

http://www.msd.co.jp/Documents/hcp/productinfo/information/pi_propecia_tab.pdf

http://www.msd.co.jp/Documents/hcp/productinfo/interviewform/if_propecia_tab.pdf

http://www.msd.co.jp/hcp/productinfo/agent/Pages/propecia_tab1.aspx

AGA-news

・適正使用について

<http://aga-news.jp/index.html>

<http://aga-news.jp/secure/launchcontents/properuse/propeciauser.html>



MSD 株式会社

〒102-8667 東京都千代田区九段北 1-13-12
ホームページ <http://www.msd.co.jp>

製品情報お問い合わせ先

MSDカスタマーサポートセンター

医療関係者の方：フリーダイヤル 0120-024-961

<受付時間>9:00~18:00（土日祝日・当社休日を除く）